

Har vi brug for akut behandling?

Blister eller blæner også kaldet after



Hvad er Blister:

Blister er tilbagevendende runde til ovale og overfladiske sår i mundslimhinden, omgivet af en rød ring. Årsagen til Blister er ukendt, men kan hos nogle have sammenhæng med skade på slimhinden opstået under bl.a. tandbørstning. Hos andre kan det være stress, menstruation, infektioner eller forringet immunforsvar.

Symptomer:

Sårene er som regel smertefulde, især når man spiser

Hvad kan I selv gøre:

Der findes ingen effektiv behandling, men en blist forsvinder af sig selv i løbet af en uges tid. Vi anbefaler Zendium tandpasta, hvis dit barn hyppigt har blister

Tandbyld også kaldet absces



Hvad er en tandbyld:

En tandbyld er en ansamling af betændelse (materie, pus), som vokser sig større over nogle dage og gør ondt. Smerterne tiltager, fordi det spænder mere og mere i vævet omkring hævelsen. Vævet kan til sidst ikke holde trykket tilbage, der går hul på bylden – en såkaldt fistel opstår - og betændelsen løber fra. De egentlige smerter forsvinder, men erstattes af en ømhed i området. Det er vigtigt at finde og få fjernet årsagen til tandbylden. Får man ikke fjernet årsagen, kommer tandbylden nemlig igen.

Symptomerne ved en tandbyld kan være:

- Rødme
- Hævelse
- Ømhed ved synkning
- Ømhed og hævelse under kæben
- En strammende fornemmelse, der udvikler sig til voldsomme dunkende smerter
- Feber
- Dårligt almenbefindende

Hvad kan I selv gøre:

En tandbyld kan gøre meget ondt. Den kan som regel ses som en lille bule lige over eller under den tand, der gør ondt.

Få hurtigst muligt en tid hos jeres tandpleje.